

Sosiaalisen vastuun vuosiraportti 2023



**Lähes
1/2**
on kokenut
yksinäisyyttä
usein tai ajoittain

n. 70%

on kokenut itsensä yksinäiseksi vapaa-ajalla viimeisen 6kk aikana

n. 40%

on kokenut yksinäisyyttä myös työpaikalla viimeisen 6kk aikana

Vastaajista noin

46%

on kokenut fyysisiä tai psyykkisiä oireita yksinäisyydestä johtuen.

Melkein

1/4

yksinäisyydestä johtuvia oireita kokenut on hakeutunut tai aikoo hakeutua oireiden vuoksi terveydenhuollon piiriin.

Hieman alle

10%

ei tiedä onko yksinäisyydestä johtuvien oireiden vuoksi mahdollista hakeutua terveydenhuollon piiriin.

Yksinäisyydestä ja eriytymisestä johtuvista oireista korostuvat mm.

ahdistuneisuus & masennus.

45%

vastaajista uskoo, että Frendie voisi auttaa yksinäisyyden torjumisessa ja uusien kavereiden löytymisessä. Vain 7% mielestä Frendie ei voisi auttaa uusien ystävien löytymisessä

15%

vastaajista oli löytänyt ystäviä Frendien avulla.

**Ainakin
2/3**

vastaajista voisi suositella Frendietä todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti lähipiirilleen.

n. 70%

vastaajista koki Frendien käyttämisen vähintään helpoksi tai erittäin helpoksi. Muutama vastaaja on kokenut palvelun vaikeakäyttöiseksi.

65% vastaajista ei ollut käyttänyt Frendietä.

Työpaikalla yksinäisyyden kokemukseen johtaneista syistä nousee esiin mm. ulkopuoliseksi jääminen.

1/2

vastaajista toivoo, että työpaikalla tarjottaisiin apua etätyön mukanaan tuomaan yksinäisyyden eristäytyneisyyden ja ongelmaan.

Yli 50%

vastaajista kertoo, ettei asia nouse esiin lainkaan työpaikoilla. **Vain 7%** vastaajista kertoo, että työpaikalla on tarjolla yksinäisyyteen apua.

Yhteisöllisyyden lisäämiseksi vapaan ideoinnin kysymyksessä esiin nousee erilaiset yhdistävät, tavalliset asiat, käytöstavat, tervehtiminen, aiheesta puhuminen sekä yhteisen tekemisen organisointi.

**Lähes
1/2
on kokenut
yksinäisyyttä**

n. 70%

on kokenut itsensä yksinäiseksi
vapaa-ajalla viimeisen 6kk aikana

n. 40%

on kokenut yksinäisyyttä myös
työpaikalla viimeisen 6kk aikana

Vastaajista noin

46%

on kokenut fyysisiä
tai psyykkisiä oireita
yksinäisyydestä
johtuen.

Melkein

1/4

yksinäisyydestä
johtuvia oireita
kokenut on hakeutunut
tai aikoo hakeutua
oireiden vuoksi
terveydenhuollon
piiriin.

Hieman alle

10%

ei tiedä onko
yksinäisyydestä
johtuvien oireiden
vuoksi mahdollista
hakeutua terveyden-
huollon piiriin.

Yksinäisyydestä ja
eriytymisestä
johtuvista oireista
korostuvat mm.

**ahdistuneisuus
& masennus.**

15%

vastaajista oli löytänyt
ystäviä Frendien avulla.

**Ainakin
2/3**

vastaajista voisi suositella
Frendietä todennäköisesti
tai erittäin todennäköisesti
lähipiirilleen.

1/2

vastaajista toivoo, että
työpaikalla tarjottaisiin
apua etätyön mukanaan
tuomaan yksinäisyyden
eristäytyneisyyden ja
ongelmaan.

Vain 50%

vastaajista kertoo, ettei
asia nouse esiin lainkaan
työpaikoilla. **Vain 7%**
vastaajista kertoo, että
työpaikalla on tarjolla
yksinäisyyteen apua.

**Työpaikalla yksinäisyyden
kokemukseen johtaneista
syyistä nousee esiin mm.
ulkopuoliseksi jääminen.**

n. 70%

vastaajista koki Frendien
käyttämisen vähintään
helpoksi tai erittäin
helpoksi. Muutama vastaaja
on kokenut palvelun
vaikeakäyttöiseksi.

65% vastaajista ei ollut
käyttänyt Frendietä.

45%

vastaajista uskoo, että
Frendie voisi auttaa
yksinäisyyden
torjumisessa ja uusien
kavereiden löytymisessä.
Vain 7% mielestä Frendie
ei voisi auttaa uusien
ystävien löytymisessä

**Yhteisöllisyyden lisäämiseksi vapaan ideoinnin kysymyksessä esiin
nousee erilaiset yhdistävät, tavalliset asiat, käytöstavat, tervehtiminen,
aiheesta puhuminen sekä yhteisen tekemisen organisointi.**